



CIAGRO

MANCOZIN

Fungicida de acción protectante de amplio espectro del grupo de los ditiocarbamatos; con una formulación ultramicrofloable que hace que exista una mejor distribución del ingrediente activo sobre la superficie de la hoja sin ocasionar el “MANCHADO DE FOLLAJE”.



Reacciona e inactiva los grupos sulfhídrico de los aminoácidos y las enzimas de las células de los hongos, dando como resultado una ruptura en el metabolismo de lípidos, respiración y producción de ATP.



- Se recomienda no efectuar más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, cada 7 – 10 días. Para prevenir cuando las condiciones climáticas propicien el desarrollo de la plaga (temperaturas bajas y alta humedad relativa) aplicar cada 14 días.

- 24 horas para reingresar al área tratada.

- Mancozin, es compatible con la mayoría de plaguicidas, fertilizantes foliares y aceites de uso agrícola. Sin embargo, la compatibilidad física debe ser previamente verificada. Es incompatible con productos alcalinos (caldo bordelés y polisulfuro de calcio)

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS (l/ha) | PC (Período de carencia) |
|--|---|--------------|--------------------------|
| Papa (<i>Solanum tuberosum</i> L.) | Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) | 3.5 – 4.0 | 7 días |
| Soya (<i>Glycine max</i>) | Roya Asiática (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>) | 2.0 – 2.5 | 7 días |



71011330



CIAGRO