

RONDO 480 SC

Herbicida sistémico no selectivo, penetra en la planta a través de tejidos fotosintéticamente activos como hojas y partes verdes del tallo. Se mueve por el floema, junto con la corriente de carbohidratos, hasta las raíces y órganos subterráneos. Interfiere con la síntesis de aminoácidos, lo cual provoca una perturbación total del metabolismo de la planta.



Se absorbe mediante el follaje, con rápida traslocación a través de la planta. Es inactivo en contacto con el suelo.



- La aplicación de RONDO 480 SC debe ser efectuada en post-emergencia cuando las malezas se encuentran en pleno desarrollo. Se recomienda efectuar una sola aplicación por temporada o ciclo de cultivo.

- Esperar a que los residuos de las pulverizaciones se sequen, antes de autorizar el reingreso de animales domésticos o personal de la finca, salvo aquel que esté provisto de equipo protector.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	
BARBECHO QUÍMICO	Chiori	(<i>Amaranthus</i> spp.)	1.0 - 3.0 l/ha
	Guapurucilla	(<i>Solanum nigrum</i>)	
	Camollito	(<i>Ipomoea nil</i>)	
	Santa Lucía	(<i>Commelina diffusa</i>)	
	Sanana	(<i>Bidens segetum</i>)	
	Chupurujume	(<i>Parthenium hysterophorus</i>)	
	Golondrina	(<i>Euphorbia hirta</i>)	
	Melva taporilla	(<i>Sida acuta</i>)	
	Mamuri	(<i>Senna obtusifolia</i>)	
	Verdolaga yuyo	(<i>Portulaca oleracea</i>)	
	Verdolaga ca mba	(<i>Talinum paniculatum</i>)	
	Pata de gallina	(<i>Digitaria ciliaris</i>)	
	Cadilo	(<i>Cenchrus echinatus</i>)	
Orizahá	(<i>Digitaria insulans</i>)		
Pata de gallo	(<i>Eleusine indica</i>)		



71011330



CIAGRO