



Conoce todos nuestros
insumos agrícolas



CIQUAT

Herbicida post-emergente de acción rápida sobre las partes verdes de la planta en un amplio espectro de malezas presentes. Es ampliamente utilizado en barbecho químico y para uniformizar la cosecha de varios cultivos.



MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa por interrupción de la fotosíntesis y que controla efectivamente malezas de hoja ancha y de hoja angosta.



CONTROL DE MALEZAS DE USO POST-EMERGENTE		
Cultivo	Malezas	Dosis (l/ha)
Barbecho químico	Chiori (<i>Amaranthus quitensis</i>)	- En campos de barbechos, con malezas en etapa vegetativa no mayor a 30 cm de tamaño y con baja población de malezas difíciles como <i>Parthenium hysterophorus</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> y <i>Senna obtusifolia</i> , se recomienda aplicar dosis baja de 1.5 l/ha. - Aplicar la dosis de CIQUAT 2.0 l/ha en campos en medio barbecho, con presencia de malezas en etapa reproductiva. - En campos, con presencia de malezas duras como <i>Parthenium hysterophorus</i> , <i>Euphorbia heterophylla</i> y <i>Senna obtusifolia</i> mayores a 30 cm., aplicar CIQUAT a dosis de 2.5 l/ha.
	Guapurucillo (<i>Solanum nigrum</i>)	
	Tonto (<i>Nycandra physaloides</i>)	
	Malva taporita (<i>Sida acuta</i>)	
	Leche leche (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	
	Verdolaga camba (<i>Talinum paniculatum</i>)	
	Mamuri (<i>Senna obtusifolia</i>)	
	Quinuilla blanca (<i>Chenopodium album</i>)	
	Chupurujume (<i>Parthenium hysterophorus</i>)	
	Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>)	
	Pata de gallina (<i>Digitaria ciliaris</i>)	
	Rogelia (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	
	Bremura (<i>Cynodon dactylon</i>)	
Maicillo (<i>Sorghum sudanense</i>)		
Sanana (<i>Bidens pilosa</i>)		



71011330



CIAGRO