



Conoce todos nuestros  
insumos agrícolas

# CIAGRO

## CONNECT

Insecticida de aplicación foliar recomendado para el control de insectos chupadores y masticadores en los cultivos con acción sobre ninfas y adultos.



**MECANISMO DE ACCIÓN:**  
De acción sistémica y de contacto.



Cultivo	Plagas	Dosis
Soya	Chinche verde pequeño (Piezodorus guildinii)	400 - 750 cm <sup>3</sup> /ha
Maíz	Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)	500 - 750 cm <sup>3</sup> /ha
	Chicharrita (Dalbulus maydis)	350 - 750 cm <sup>3</sup> /ha
Papa	Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum)	750-1000 cm <sup>3</sup> /ha 200 L de agua

### ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar la aplicación cuando se tenga un promedio de 1 chinche por metro lineal, iniciar el control en estadio R3 a R5 junto con la aplicación de fungicidas. Realizar máximo 1 aplicación por campaña, en caso de reinfestación aplicar insecticidas de diferente modo de acción.

Papa: Realizar la aplicación 40-45 días después de la emergencia del cultivo. En caso de reinfestación aplicar 15 días después de la aplicación.



71011330



CIAGRO